



FOLK
TAND
VÅRDEN
SKÅNE

Ortodonti – Skåneindex/ prioriteringsindex gäller fr.o.m 201001

Exempelbilder



1. Mycket stort behov



a. Läpp-, käk-, gomspalter





b. Syndrom med käk-, och/eller bettavvikelser





**c. Extrema postnormala bett, mer än 9mm horisontell
överbitning, utseenemässigt eller funktionellt handikappande**





d. Extrema prenatala bett, mer än 3,5 mm negativ horisontell överbitning, utseendemässigt och/eller funktionellt handikappande





e. Extremt öppna bett, med stor vertikal öppning och endast kontakt i molarområdet





**f. Lateralt öppna bett utan molakontakter,
uni- eller bilateralt**





f. Totalt saxbett uni- eller bilateralt






h. Agenesesi, förlust eller retention av överkäkscentraler





i. Omfattande agenesi, mer än eller lika med 4 tänder i en käke eller mer än eller lika med 2 tänder i samma kvadrant





i. Omfattande traumaskador





k. Retention/ektopisk eruption av hörntänder (alltid förtur!)





2. Stort behov



a. Prenormalt bett/frontal invertering med tvångsföring



Interkuspurations
läge



Redruderat läge



**b. Total frontal invertering/prenormalt bett, mer än 1mm
men mindre eller lika med 3.5 mm negativ horisontell
överbitning, med nedsatt tuggfunktion**





**c. Stor horisontell överbitning:
mer än eller lika med 6 mm men mindre än eller lika med 9 mm,
med funktionell påverkan och/eller inkompetent läppslutning**





d. Inkompetent läppslutning orsakad av proklinerade incisiver och/eller bimaxillär protrusion





e. Öppet bett omfattande mer än hörntand till hörntand





f. Lateralt öppna bett mer än 2 tandpar på en sida






g. Djup bett med gingival påbitning





h. Enkelsidigt korsbett/korsbitning med tvångsföring





**i. Saxbett/saxbitning med tvångsföring, saxbitning
första molarer eller mer än 1 tandpar i samma kvadrant**





j. Agenesesi/förlust av hörntänder eller lateraler i överkäken




Aplasi 13
53 persisterar






k. Retention/ektopisk eruption av lateraler (alltid förtur!)





I. Agenesi av mer än totalt 4 premolarer eller mer än 1 premolar i samma kvadrant





m. Starkt uttalade trång- och glesställning, rotationer, tippningar eller andra positionsavvikelser, med förskjutning av kontaktpunkt 4 mm eller mer, och som är uppenbart funktionellt och/eller estetiskt störande.





m. Starkt uttalade trång- och glesställning, rotationer, tippningar eller andra positionsavvikelser, med förskjutning av kontaktpunkt 4 mm eller mer, och som är uppenbart funktionellt och/eller estetiskt störande






**n. Diastema mediale i det permanenta bettet (mer än 2 mm),
där komposituppbyggnad inte är lämplig**





o. Traumaskador eller retinerade tänder där ortodontisk behandling är lämplig



Ortodontisk extrusion för friläggning av frakturlinje



o. Traumaskador eller retinerade tänder där ortodontisk behandling är lämplig



Retinerade 37, 47



p. Återkommande smärttillstånd i
käk- ansikts- och huvudregionen
med misstänkt
bettdysfunktionsgenes
efter bettfysiologisk
utredning.





3. Måttligt eller ringa behov



**a. Pre- och postnormala bett utan andra anomalidrag
som kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex**





b. Horisontell överbitning mindre än 6 mm





c. Djupt bett utan gingival påbitning





d. Begränsade öppna bett utan funktionsstörning, med liten frontal öppning eller mindre än 2 tandpar i sidoregionen






e. Korsbett/korsbitning utan tvångsföring





**f. Saxbitning enstaka premolarer eller andra molarer
utan tvångsföring**





g. Mindre uttalade trång- och glesställningar, rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex





g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex





g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex





g. Exempel – Mindre uttalade trång- och glesställningar, rotationer eller tippningar, vilka ej kan hänföras till grupperna 1 eller 2 i Skåneindex





h. Diastema mediale mindre än eller lika med 2 mm, eller där komposituppbyggnad är lämplig





i. Agenesesi av enstaka premolarer utan andra bettavvikelser

